

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 2 - 6 - 69 934042

20
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE LA RÉGION PARISIENNE

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE ST-DENIS, VAL DE MARNE, ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE ET MARNE, EURE

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 47 Av. Paul-Doumer, (93) MONTREUIL-S-BOIS - 287 76-71

C. C. P. PARIS 9063-96

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

BULLETIN N° 104

Supplément n° 1

20 MAI 1969

AVERTISSEMENTS

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER

CULTURES FRUITIÈRES

L'efficacité du dernier traitement a été diminuée par les pluies d'orage, les risques de contamination sont toujours notables et la végétation évolue. La sortie des taches va se poursuivre au cours de la semaine ; de nouvelles taches risquent d'apparaître en fin de mois. Une protection soignée des arbres s'impose donc.

INFORMATIONS.

- ACARIENS : Avec le temps chaud, les éclosions ont été généralement intenses. Il reste néanmoins des oeufs d'hiver. Des oeufs d'été ont été observés dans la plupart des secteurs. Toute intervention devra donc être réalisée avec un produit susceptible de détruire larves, nymphes, adultes et oeufs.

- DIVERS : Activité des Pucerons et des Psylles ; apparition des chenilles de l'Hypomomeute.

CULTURES LEGUMIÈRES

- MOUCHES DU CHOU ET DE L'OIGNON : Les sorties quoique plus faibles, se poursuivent.

- ANTHRACNOSE DU HARICOT : Le premier traitement, le plus important, doit être effectué au stade deux feuilles étalées, avec Captane, Manèbe, Mancozèbe, Phaltane, Thirame, Zinèbe, Zirame, à 2 kg m. a./ha. La pulvérisation pneumatique donne les meilleurs résultats.

GRANDES CULTURES

- ENNEMIS DE LA BETTERAVE : De nouvelles pontes de Pégomye ont été déposées dans de nombreux secteurs depuis le 10 mai. L'éclosion est en cours. Ces pontes risquent de provoquer, sur jeunes betteraves, des dégâts notables. Le traitement ne doit intervenir que sur les jeunes mines et non sur les oeufs.

Des colonies de Puceron noir sont observées dans la plupart des cultures. Réaliser éventuellement un traitement efficace contre Pégomye et Pucerons.

- THRIPS SUR LIN : Population variable. Utiliser un insecticide chloré : (D.D.T., Lindane) ou phosphoré (Parathions, Diazinon, Malathion).

- MILDIOU DE LA POMME DE TERRE : Des taches ont été notées sur tas de déchets de la récolte précédente. A partir de ces derniers, des contaminations n'ont pu se produire que dans des situations favorables (zones humides, végétation développée). Surveiller attentivement les cultures placées dans ce cas, surtout en fin de semaine. Nous signaler toute apparition de taches.

- MILDIOU - OIDIUM : Effectuer un premier traitement.

VIGNE

L'Ingénieur et l'Agent Technique
chargés des Avertissements Agricoles,
H. SIMON et R. MERLING.

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux,
G. BERGER.

Imprimerie de la Station de la Région Parisienne - Directeur-Gérant : L. Bouyx.
47, Avenue Paul Doumer - 93 - MONTREUIL-Ss-BOIS.

7205